

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v triển khai phòng trừ rầy nâu,
rầy lưng trắng gây hại lúa
vụ Đông xuân 2022-2023

Kính gửi:

- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm DVNN huyện.

Hiện nay, lúa Đông Xuân trà sớm đang giai đoạn: Ngâm sữa – thu hoạch, lúa đại trà giai đoạn mút đòng - trổ đều; lúa trà muộn: Đẻ nhánh rộ - làm đòng. Theo báo cáo của Trung tâm DVNN, rầy nâu, rầy lưng trắng đang phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn mút đòng – trổ đều. Tổng diện tích nhiễm: 20 ha, trong đó: MĐ: 750 - 1.500 con/m², DTN 10,5 ha; MĐ: 1.500 - 3.000 con/m², DTN 5 ha; MĐ 3.000 - 6.000 con/m², DTN 4,5 ha (cục bộ ổ > 6.000 con/m²). Phát dục tuổi rầy tập trung tuổi 3-4, trưởng thành, mang trứng.

Dự báo trong thời gian đến, rầy nâu và rầy lưng trắng tiếp tục nở và rộ từ 05/3-20/3/2023, gây hại nặng cục bộ trên lúa mút đòng – chắc xanh; tập trung gây hại ở các xã: Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Quang, Phước Hiệp, Phước An, Phước Nghĩa, ... Để hạn chế thiệt hại do rầy nâu, rầy lưng trắng gây ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

- Tăng cường công tác kiểm tra, dự tính, dự báo chính xác về tình hình phát sinh và diễn biến rầy nâu, rầy lưng trắng. Đề ra các giải pháp để chủ động tổ chức, hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy (có hướng dẫn kèm theo).

- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu cho UBND huyện về công tác chỉ đạo phòng trừ rầy; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nông dân phun trừ kịp thời, đạt hiệu quả. Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động, thông báo, hướng dẫn, nông dân tập trung phun trừ khi có mật độ rầy cao.

- Phối hợp UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xác định diện tích nhiễm rầy; tham mưu UBND huyện đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất thuốc hỗ trợ chống rầy cho các địa phương. Báo cáo kịp thời tình hình và công tác tổ chức phòng trừ rầy cho UBND huyện.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp phối hợp với Tổ chỉ đạo sản xuất huyện tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc diễn biến, diện tích bị rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại trên địa phương mình.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể thông báo, hướng dẫn, vận động bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phun thuốc phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng kịp thời, đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh thông tin, tuyên truyền về tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại lúa Đông Xuân và hướng dẫn biện pháp phòng trừ (nêu cụ thể những vùng bị nhiễm rầy, cần phun thuốc trừ để bà con nông dân biết, thực hiện).

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Giám đốc Trung tâm DVNN huyện và các ngành có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục Trồng trọt và BVTV (b/c);
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Phòng Nông nghiệp và PTNT (t/h);
- TT VH-TT-TT huyện;
- CVP, PCVP – 2;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân

HƯỚNG DẪN biện pháp phòng trừ rầy

- Kiểm tra đồng thường xuyên, phát hiện sớm rầy non nở.
 - Khi phát hiện rầy có mật độ từ 1.000 – 5.000 con/m² thì dùng một trong các loại thuốc trừ rầy sau để phun:
 - + Thuốc **Titan 600WG**, liều lượng 20 gam thuốc pha 32 lít nước phun 1 sào (500 m²).
 - + Thuốc **Acnipyram 50 WP (chet ray)**, liều lượng 21 gam thuốc pha 24 lít nước phun 1 sào.
 - Đối với ruộng có mật độ rầy cao trên 5.000 con/m², rầy có nhiều giai đoạn phát dục (có cả rầy non và trưởng thành), nguy cơ “cháy rầy” cao, có thể sử dụng các công thức phun như sau:
 - + Thuốc **Acnipy Ram 50 WP (chet ray)**, liều lượng 28 gam thuốc pha 32 lít nước phun 1 sào.
 - + 100 ml **Bassa 50EC** hỗn hợp với 20 gam **Titan 600WG** hoặc 15 gam **Chess 50WG**, pha 32 lít nước phun 1 sào.
- *Lưu ý: Để đảm bảo hiệu quả trừ rầy:*
- + Cho nước vào ruộng 5-15 cm trước khi phun;
 - + Phun thuốc phải đảm bảo lượng nước như hướng dẫn, phun kỹ vào thân và gốc lúa.
 - + Phun vào chiều mát hoặc sang sớm.
- Sau khi phun 3-5 ngày, tiến hành kiểm tra ruộng, nếu thấy rầy còn sót lại cao hơn 1.000c/m² (tương đương 2con/dảnh) thì phun lại lần 2.